

News - 08/10/2020

## SALUTE - Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/21

**Regione Lazio: vaccinazione antinfluenzale fortemente raccomandata e gratuita per over 60, bambini da 6 mesi a 5 anni, tutto il personale sanitario**

Quest'anno il virus influenzale cirolerà contemporaneamente al SARS-CoV-2 (Coronavirus) e questo rende la vaccinazione contro l'influenza ancora più importante. Il vaccino, utilizzato da oltre quarant'anni come principale strumento ed opportunità di prevenzione, si è dimostrato efficace e sicuro.

Per questo motivo la Regione Lazio **raccomanda fortemente la vaccinazione alle persone dai 60 anni di età** garantendone la gratuità.

**La vaccinazione è fortemente raccomandata** anche a medici, personale sanitario, anche volontario, e in genere a tutti i lavoratori essenziali dell'area sanitaria.

**La vaccinazione è raccomandata e gratuita anche per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni compiuti.**

La vaccinazione antinfluenzale assume una particolare importanza perché aiuta a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, contribuisce a ridurre le complicazioni da influenza nei soggetti a rischio e a gestire meglio gli accessi al pronto soccorso.

Inoltre, insieme alla vaccinazione antinfluenzale, specialmente **per chi soffre di patologie croniche, è raccomandata la vaccinazione anti-pneumococcica**, utile a prevenire le polmoniti batteriche: le due vaccinazioni possono essere fatte contemporaneamente.

### **Dove è possibile vaccinarsi?**

Se sei un adulto puoi vaccinati:

- presso il medico di famiglia;
- presso i Servizi vaccinali della ASL;
- in alcuni casi presso la sede di lavoro dal medico del lavoro.

**Se invece devi vaccinare tuo figlio puoi rivolgerti al pediatra di libera scelta che ti darà le indicazioni per effettuare la vaccinazione presso il proprio ambulatorio o presso il Servizio vaccinazioni della ASL.**

Sul sito Internet della tua ASL troverai infine informazioni complete su altri contesti particolari di erogazione eventualmente allestiti nel tuo territorio.

Chi si vaccina

**Ricordiamo che la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e gratuita per:**

- **le persone dai 60 anni di età;**
- **bambini con età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni**
- **medici, personale sanitario, anche volontario e tutti i lavoratori essenziali dell'area sanitaria.**

Inoltre la campagna vaccinale gratuita coinvolge anche altri settori della popolazione, **puoi consultare qui l'elenco** di chi, per motivi di lavoro o per motivi di salute, ha diritto o è invitato attivamente ad usufruirne.

La Regione Lazio, con l'Ordinanza n. 62 del 02/10/2020, ha disposto la disponibilità di dosi di vaccino antinfluenzale presso le farmacie, con oneri a carico del cittadino, per le persone tra i 18 e i 59 anni che volessero ricorrere comunque alla vaccinazione.

Per saperne di più

La vaccinazione non provoca generalmente alcun disturbo. In alcuni casi possono verificarsi alcuni inconvenienti, generalmente di lieve entità, come:

- reazioni locali, come arrossamento e gonfiore nella sede di iniezione
- reazioni generali, come febbre, malessere, dolori muscolari che scompaiono in 1-2 giorni (più frequenti nelle persone mai vaccinate in precedenza).
- In casi molto rari si possono verificare:
  - reazioni allergiche rappresentate da orticaria e asma e, nei casi più gravi, da reazione anafilattica, queste ultime possono comparire in soggetti allergici alle proteine dell'uovo in quanto i vaccini sono prodotti coltivando il virus in uova embrionate di pollo;
  - diminuzione transitoria delle piastrine, nevralgie e disturbi neurologici.

**Le uniche controindicazioni vere alla vaccinazione sono rappresentate da:**

- età inferiore ai 6 mesi;
- pregresse reazioni di tipo anafilattico alle proteine dell'uovo (in questi casi è possibile utilizzare vaccini prodotti in colture cellulari) o ad altri componenti del vaccino;

- severe reazioni a vaccino antinfluenzale nel passato;
- sindrome di Guillain Barrè manifestatasi entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino antinfluenzale.

**La vaccinazione antinfluenzale deve essere rimandata in caso di malattia febbrile in atto.**

Nel caso di comparsa di effetti secondari è opportuno consultare il medico di famiglia o il medico del Servizio che ha effettuato la vaccinazione.

---

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>